



RS di Spairani
www.rsmilano.it

Valutazione dello Stato di coscienza del Paziente e della Sicurezza Operativa della Scena

La vittima Non Risponde

A : AIRWAY
Mettere in atto le opportune manovre finalizzate ad ottenere la pervietà delle vie aeree

B: BREATHING
Il soggetto Respira?
Esegui e valutare per 5-10 sec.
la sequenza G A S
(Guardare-Ascoltare-Sentire)

Se il paziente Respira:
porlo in posizione laterale di sicurezza

Se il paziente NON Respira:

**Chiedere AIUTO
Telefonare 118**

Se Polso Presente:
continuare la ventilazione sino a ripresa di coscienza o arrivo di soccorsi ALS

C : CIRCULATION
Il polso è presente?
Valutare per max 10 sec
nel dubbio agire come in assenza

Se Polso Assente:
effettuare RCP
MCE (Massaggio Cardiaco Esterno) +
VENTILAZIONE
30 massaggi e 2 ventilazioni
Ritmo Compressioni: 100 al min
Insufflare 500-600 ml /sec
sino a disponibilità del DAE

Se DAE NON Disponibile:
continuare RCP (Rianimazione Cardio Polmonare):
MCE + ventilazione
30 + 2
con controllo del polso ogni minuto
sino a ripresa di coscienza
o arrivo di soccorsi ALS

D : DEFIBRILLATION
E' disponibile DAE ?

Se DAE Disponibile:
collegare elettrodi al paziente
ed avviare analisi del ritmo
(In caso di AC non testimoniato o superiore ai 5 Min. eseguire RCP per 2 Min prima dell'analisi del ritmo)

DAE: ANALISI DEL RITMO

SHOCK INDICATO
seguire indicazioni del DAE

DEFIBRILLA
1 sola volta se indicato

RCP per 2 Minuti
MCE : Ventilazione = 30:2

SHOCK NON INDICATO

Polso e segni di circolo?
se Assenti
RCP per 2 Minuti

SE POLSO O SEGNI DI CIRCOLO RICOMPAIONO
Valutare la Respirazione e, se Assente, Insufflare ogni 6 sec.
(10 Ventilazioni / Min.) Rivalutare i segni di circolazione ogni minuto sino a ripresa della coscienza o arrivo dei soccorsi ALS